

INFORMATIVA COLPOSCOPIA

Che cos'è: La colposcopia è un'indagine diagnostica ambulatoriale di secondo livello che consente di visionare a forte ingrandimento i genitali femminili (vulva, perineo, vagina, cervice uterina) servendosi di un particolare microscopio: il colposcopio.

Quando si esegue:

- Dopo un Pap-Test che segnala alterazioni
- Per controllare nel tempo l'evoluzione di un'area anomala evidenziata nella vagina o nel collo dell'utero
- Per confermare l'efficacia di un trattamento fatto in precedenza

Si effettua preferibilmente fuori dal ciclo mestruale, meglio se a metà ciclo, lontano da terapie con ovuli, creme e lavande vaginali.

In menopausa può essere seguito in qualsiasi momento, non è controindicato in gravidanza.

Come si esegue:

La colposcopia richiede un tempo che varia dai 5 ai 15 minuti, non è dolorosa e non prevede alcuna preparazione.

Il medico inserisce lo speculum in vagina, evidenzia il collo dell'utero e lo osserva attraverso un apposito strumento, il colposcopio; tampona la zona con batuffoli imbevuti prima di acido acetico al 5% poi con una soluzione a base di iodio che evidenziano meglio le aree con eventuali atipie o alterazioni.

Si raccomanda di segnalare eventuale allergia a Iodio.

Se la colposcopia mette in evidenza zone di alterazione, il medico potrebbe effettuare un biopsia mirata (prelievo di un frammento di tessuto) da analizzare mediante esame istologico che completerà la diagnosi.