

URETROCISTOSCOPIA

Definizione L'uretrocistoscopia è un esame diagnostico che permette l'ispezione visiva delle pareti della vescica, del collo vescicale, dell'uretra e dei meati ureterali usando uno strumento detto cistoscopio.

Indicazioni Sono indicazioni l'ematuria, disturbi della minzione di tipo irritativo ed ostruttivo non ritenuti diagnosticabili in altro modo, la calcolosi vescicale, lo studio delle neoformazioni vescicali segnalate da esami di diagnostica per immagini, o sospettate clinicamente, o sulla base di esami citologici di rilevazione di marcatori urinari o ematici ritenuti sensibili.

Descrizione della tecnica E' una procedura ambulatoriale eseguita in asepsi. Non è necessario essere digiuni e a vescica vuota. Generalmente è ben accettata dai pazienti e non richiede anestesia generale o periferica. Di solito è sufficiente lubrificare l'uretra con 5-10 cc di gel lubrificante che contiene dell'anestetico. Se il fastidio durante la procedura dovesse divenire eccessivo, l'operatore potrebbe decidere di sospendere la procedura o continuarla previo utilizzo di assistenza anestesiológica. Il cistoscopio viene introdotto nell'uretra e risale sino a raggiungere la vescica che viene distesa con soluzione irrigante per ispezionarne le pareti. La posizione assunta per effettuare l'esame è supina con le gambe sollevate sui gambali. A volte in caso di lesioni vescicali sospette potrebbe essere necessario il prelievo attraverso un'apposita pinza di materiale biologico e successivamente mandarlo ad analizzare.

Durata della procedura Varia da 5 ai 20 minuti a seconda della facilità con cui può essere raggiunta e ispezionata la vescica.

Preparazione alla procedura E' consigliabile una copertura antibiotica (profilassi)

Complicanze Generali anestesiológicas, cardiocircolatorie, polmonari, metaboliche, infettive.

Complicanze Specifiche Sono rappresentate da lesioni dell'uretra, uretrorragia, ematuria, infezione, urgenza minzionale, ritenzione acuta d'urina, pollachiuria, bruciore minzionale, sono generalmente temporanee e facilmente curabili con terapia medica